



GUIA DE TRATAMIENTOS

LIVINOE

RECOMENDACIÓN Y MODO DE EMPLEO

PROBLEMA DE SALUD	PRODUCTO SUGERIDO	MODO DE CONSUMO	T. DE TRATAMIENTO
HIGADO GRASO	Nucelhe	1 Cap. tres veces al día	De 1 a 3 meses
CIRROSIS	Nucelhe + Inmunet	Nucelhe: 1 cap. tres veces al día Inmunet: 2 cap. al día	De 3 a 4 meses
HEPATITIS	Nucelhe + Inmunet + Vita C	Nucelhe: 1 cap. tres veces al día Inmunet: 2 cap. al día Vita C: 2 cap. mañana y tarde	1 mes
COLESTEROL Y TRIGLICÉRIDOS	Nucelhe	1 Cap. tres veces al día	De 3 a 4 meses
CÁLCULOS EN LA VESICULA	Nucelhe + Aceite de Menta	1 Cap. tres veces al día 2 gotas en un vaso con agua. 3V al día	De 2 a 3 meses
DIABETES	R G S + Factor p53	RGS: 1 Cap. tres veces al día FP53: 1 cap. al día	De 5 a 7 meses
GASTRITIS POR BACTERIA HP	G3 + Nucelhe	G: 2 Cap. 3 tres veces al día D/C N: 1 Cap. tres veces al día	2 meses
ULCERA GASTRICA	G3 + Nucelhe + Factor P53	G: 2 Cap. 3 tres veces al día D/C N: 1 Cap. tres veces al día FP53: 2 cap. Al día	De 1 a 2 meses
ESTREÑIMIENTO	Oxicolon + Fib8	O: 2 Cap. tres veces al día x 5 días F: 1 Cucharada mañana y noche	Hasta recuperar
SÍNDROME DE COLON IRRITABLE	Fib8 + S3	F: 1 Cucharada mañana y noche S: 1 Cap. mañana y noche	Hasta recuperar
HEMORROIDES	Moringa + Vita C + Fib8	M: 2 Cap. Tres veces al día V: 1 Cap. mañana y tarde F: 1 cucharada mañana y noche	De 1 a 2 meses

PROBLEMA DE SALUD	PRODUCTO SUGERIDO	MODO DE USO	T. DE TRATAMIENTO
DESNUTRICIÓN Y ANEMIA	Spirulina +Vita c	E: 2 Cap. Tres veces al día V: 1 Cap. Tres veces al día	De 15 días a 1 mes
CRECIMIENTO DE LOS NIÑOS	Spirulina + Super zn	S: 1 cucharada en la mañana Sz: 1 cap. masticable con cada comida	
ASMA BRONQUIAL	Inmunet + Factor P53 + A. Eucalipto	I: 2 cap. Al día Fp53: 3 cap. Al día M: Inhalación mañana y noche	De 2 a 3 meses, luego continuar con FP53 Hasta recuperar
GRIPE y RESFRIADO	Doliv + A de Eucalipto	D: 2 cap. Cada 6 horas x 3 días A: 2 gotas en inhalación maña y noche	De 3 a 5 días
ARTRITIS REMATOIDEA	Fp53+ Inmunet+ Colágeno+ Doliv	F: 2 cap. Al día I: 2 cap. Al día C: 1 cucharada en la mañana D: 2 cap. Juntas cuando hay dolor	De 3 a 4 meses, luego continuar con Inmunet y colágeno por periodos continuos o intermitentes
ARTROSIS	Colágeno + Biocal + Doliv	C: 1 cucharada en la mañana B: 3 cap. al día D: 2 cap. Juntas cuando hay dolor	De 3 a 4 meses, luego continuar con colágeno por periodos continuos o intermitentes
OSTEOPOROSIS y OSTEOARTROSIS	Biocal + colágeno + Doliv	B: 2 cap. Tres veces al día C: 1 cucharada en la mañana D: 2 cap. Juntas cuando hay dolor	De 3 a 4 meses, luego continuar con Biocal por periodos continuos o intermitentes
CABELLO, PIEL, TENDONES Y MUSCULOS	Colágeno con vitamina c + Inmunet	C: una cucharada (10gr) en la mañana I: 1 cap. Al día	Hasta alcanzar lo deseado

PROBLEMA DE SALUD	PRODUCTO SUGERIDO	MODO DE USO	T. DE TRATAMIENTO
OBESIDAD	Slim QG + Oxicolon + Nuclehe	S: 2 cap. Tres veces al día O: 2 cap. Tres veces al día (x 5 días) N: 1 cap. Tres veces al día	Hasta alcanzar el peso deseado
DOLOR E INFLAMACIÓN	Doliv + Aceite de menta	D: 2 cap. Juntas cada seis horas después de comer A: colocar 1 gota en la zona del dolor	De 3 a 5 días, luego solo cuando hay dolor
INSOMNIO	Vital FSN + S3	V: 2 cap. Antes de dormir S: 1 cap. Antes de dormir	Hasta alcanzar el estado normal
ESTRES	S3 + Vital FSN + Aceite de Romero	S/V: 1 cap. c/u, mañana y noche A: 1 Gota debajo la lengua M y N	Hasta sentirse bien
PRE -DERRAME	Vital FSN + Inmunet	V: 2 cap. Juntas mañana y tarde I: 2 cap. Juntas por la mañana	De 15 a 30 días
DESEQUILIBRIO DEL SISTEMA NERVIOSO	Vital FSN	2 cap. Al día	X 30 días
PROBLEMAS DE PRÓSTATA (HPB)	Hom+	2 cap. Juntas al día	De 1 a 2 meses
DISFUNCIÓN ERECTIL	Hom+ + Súper Zn	H: 2 cap. Juntas al día Sz: 1 cap. En cada comida	Uso continuo x un mes; luego intermitentemente
MALA CIRCULACIÓN DE LA SANGRE Y VARICES	Moringa + Nuclehe + Vita C	M: 2 cap. Antes de cada comida N: 1 cap. Antes de cada comida V: 1 cap. antes de cada comida	Hasta alcanzar la estabilidad
CALCULOS RENALES	Nef	3 cap. Al día antes de las comidas	x 30 días
INSUFICIENCIA RENAL	Nef + Factor P53	2 cap. De c/u tarde y mañana	Hasta alcanzar el estado normal
RETENCION DE LIQUIDOS	Nef. P53	1 cap. Tres veces al día antes de comer	De 15 a 30 días

PROBLEMA DE SALUD	PRODUCTO SUGERIDO	MODO DE USO	T. DE TRATAMIENTO
ACIDO URICO EN LA SANGRE / GOTA	Nef + Vita C	N: 2 cap. Tres veces al día V: 1 cap. Tres veces al día	De 1 a 2 meses
FIBROSIS PULMONAR	Inmunet + Factor P53	I: 2 cap. mañana y tarde F: 1 cap. Tres veces al día	De 4 a 7 meses
MIOMAS Y OVARIOS POLIQUISTICOS	Inmunet + Factor P53	I: 2 cap. Tarde y mañana F: 1 cap. Tarde y mañana	De 1 a 2 meses
PARKINSON Y ALZHEIMER	Inmunet + Factor p53	I: 2 cap. Tarde y mañana F: 1 cap. Tres veces al día	De 4 a 7 meses
LUPUS	Factor P43 + Inmunet + vital FSN	F: 1 cap. tres veces al día I: 1 cap. Tres veces al día V: 1 cap. Mañana y noche	De 4 a 7 meses
CARCINOMAS	Factor P53 + Doliv + Spirulina	F: 2 cap. Tres veces al día D: 2 cap. Juntas cuando hay dolor E: 1 cap. Con cada comida	De 4 a 7 meses
SORIASIS	Factor P53 + Inmunet + Vital FSN	F: 2 cap. Tres veces al día I: 1 cap. Mañana y tarde V: 2 cap. Antes de dormir	De 4 a 7 meses
QUISTES HEPATICOS	Nucelhe + FactorP53	N: 1cap. Tres veces al día F: 1 cap. Tres veces al día	De 2 a 3 meses
PACIENTES CONVALECIENTES	Factor P53 + S3	F: 1 cap. Mañana y tarde S: 1 cap. Antes de dormir	Hasta recuperarse
INFLAMACIÓN DEL NERVIIO CIATICO	Vital FSN + S3+ Doliv	V: 2 cap. Mañana y Tarde S: 1 cap. Antes de dormir D: 2 cap. Cada seis horas x 5 días	De 15 días a un mes

PROBLEMA DE SALUD	PRODUCTO SUGERIDO	MODO DE USO	T.DE TRATAMIENTO
FIBROMIALGIA Y PROBLEMAS LUMBARES	S3 + Vital FSN + Doliv	S: 2 cap. antes de dormir V: 1 cap. mañana y noche D: 2 cap. juntas cuando hay dolor	De 15 días a un mes
VIRUS Y BACTERIAS	Factor P53 + Inmunet	F: 1 Cap. tres veces al día I: 2 Cap. al día	1 mes
DEFICIENCIA INMUNE	Inmunet + Factor P53	I: 1 Cap. Mañana y tarde F 1 Cap. Mañana y tarde	Hasta alcanzar el nivel Ideal

IMPORTANTE

La presente guía de recomendaciones de productos Livinoe está elaborado bajo criterios profesionales y basado en los resultados obtenidos con las personas recuperadas. No obstante, el modo de empleo puede variar según el caso y la gravedad del problema;

Para uso preventivo y/o suplemento alimenticio, consumir 1 cápsulas al día

Evitar el consumo de: azúcar, carnes rojas, frituras, harinas refinadas, enlatados, condimentos irritantes y toda comida chatarra durante el tratamiento. Las recomendaciones alimenticias tienen una generalidad en común, excepto ciertos casos en los cuales requiere una recomendación específica.