



GUIA DE RECOMENDACIÓN

Tratamientos alternativos





PROBLEMAS DE SALUD

ÁCIDO ÚRICO/ GOTA
ACNÉ JUVENIL
AGOTAMIENTO
ALZHEIMER
AMNESIA
ANEMIA
ANSIEDAD - DEPRESIÓN
ART. REUMATOIDEA
ARTROSIS
ASMA BRONQUIAL
ALTERACIÓN NERVIOSA
AGOTAMIENTO FÍSICO
CÁLCULOS RENALES
CÁNCER
CIRROSIS HEPÁTICA
COLESTEROL ELEVADO
COLELITIASIS
CRECIMIENTO INFANTIL
CAÍDA DEL CABELLO

DESEQUILIBRIO NERVIOSO
DEFENSAS BAJAS
DIABETES
DISFUNCIÓN ERECTIL
DOLOR y FIEBRE
ESTREÑIMIENTO
ESTRÉS
ESCLERODERMIA
FIBROSIS PULMONAR
GASTRITIS - BACTERIA HP
HEMORROIDES
HEPATITIS
HÍGADO GRASO
HIPERTIROIDISMO
INSOMNIO
INFLAMACIONES
INFECCIÓN VIAS URINARIAS
LUMBALGIA
LEUCEMIA

LUPUS
LIMPIEZA DE COLON
MALA CIRCULACIÓN
MENOPAUSIA
MIGRAÑA
MIOMAS UTERINOS
OSTEOPOROSIS
OV. POLIQUÍSTICOS
PIEL FLÁCIDA
PARKINSON
PRE DERRAME
PRESIÓN ALTA
PROSTATITIS
PSORIASIS
RESFRIOS /GRIPE
SIND. DE COLON IRRITABLE
TRIGLICÉRIDOS ELEVADOS
TOS CRÓNICA
TUMORES BENIGNOS

ÚLCERA GÁSTRICA
VARICES
VEJEZ PREMATURA
VITILIGO
VIRUS DEL PAPILOMA H. (VPH)
VISIÓN BORROSA/CATARATA



Mejora tu vida...!

LIVINOE SALUD

IMPORTANTE

La presente guía de recomendaciones de consumo de productos Livinoe está elaborado bajo criterios profesionales y basado en los resultados obtenidos.

Los productos Livinoe son formulados con extractos naturales estandarizados, por lo que tienen efecto regenerativo y nutricional, no presentan ninguna contraindicación ni efecto secundario.

Los productos Livinoe también cumplen la función preventiva y complementaria a la alimentación diaria; para este uso se recomienda consumir la mitad de la cantidad recomendada.

LIVINOE



PROBLEMA DE SALUD	PRODUCTO SUGERIDO Principal/complementario	MODO DE CONSUMO
ÁCIDO ÚRICO/ GOTA	• INMUNET • NEF • FNC	1 Caps. una hora antes del desayuno y cena 1 Cap. media hora antes del desayuno y cena. 1 Cap. al acostarse y levantarse
ACNÉ JUVENIL	• YOUNG • INMUNET/ EHFEM • FNC	1 Caps. media hora antes del desayuno. 1 Caps. una hora antes del desayuno. 1 Cap. al acostarse y levantarse
AGOTAMIENTO FÍSICO	• ENERGY NL • SPIRULINA	1 ó 2 Caps. después del desayuno. 1 Cap. en cada comida
ALZHEIMER	• INMUNET • YOUNG • VITAL FSN	1 Caps. una hora antes del desayuno y cena. 1 Cap. media hora antes del desayuno y cena. 1 Cap. después del desayuno.
AMNESIA	• INMUNET • VITAL FSN • YOUNG	2 Cap. una hora antes del desayuno. 1 Cap. después del desayuno. 1 Cap. media hora antes de desayuno y cena.
ANEMIA	• SPIRULINA • FNC • INMUNET	3 Cap. en cada comida. 1 Cap. al levantarse y al acostarse. 1 Caps. una hora antes del desayuno y cena
ANSIEDAD - DEPRESIÓN	• VITAL FSN • INMUNET • S3	1 ó 2 Cap. después de desayuno 1 Cap. una hora antes del desayuno y cena. 2 Caps. una hora antes de dormir.



PROBLEMA DE SALUD	PRODUCTO SUGERIDO Principal/complementario	MODO DE CONSUMO
ART. REUMATOIDEA	• FACTOR P53 • YOUNG • INMUNET • REVIT HT2 • DOLIV	2 Cap. media hora antes de cada comida. 1 Cap. media hora antes de desayuno y cena 1 Cap. una hora antes del desayuno y cena 1 Cap. después del desayuno y cena 2 Cap. cuando hay dolor
ARTROSIS	• REVIT HT2 • BIOCAL • DOLIV • INMUNET	2 Cap. después del desayuno y cena. 1 Cap. en cada comida. 2 Caps. cuando hay dolor 1 Cap. una hora antes del desayuno y cena
ASMA BRONQUIAL	• FACTOR P53 • INMUNET • SPIRULINA	1 Cap. media hora antes de cada comida. 1 Cap. una hora antes del desayuno y cena 1 Cap. en cada comida
ALTERACIÓN NERVIOSA	• VITAL FSN • INMUNET	2 Cap. después del desayuno 1 Cap. una hora antes del desayuno y cena
ALERGIAS	• FACTOR P53 • SPIRULINA • INMUNET	1 Cap. antes del desayuno y cena. 1 Cap. en cada comida. 1 Cap. antes del desayuno y cena
CÁLCULOS RENALES/ ARENILLA	• NEF • FNC • INMUNET	1 Cap. media hora antes de cada comida. 1 Cap. antes del desayuno 1 Cap. una hora antes del desayuno y cena
CÁNCER	• FACTOR P53 • INMUNET • YOUNG • SPIRULINA • DOLIV	3 Cap. media hora antes de cada comida. 1 Cap. una hora antes del desayuno y cena 1 Cap. media hora antes de desayuno y cena. 1 Cap. en cada comida. 2 ó 3 Caps. Cuando hay dolor



PROBLEMA DE SALUD	PRODUCTO SUGERIDO Principal/complementario	MODO DE CONSUMO
CAÍDA DEL CABELLO	• YOUNG • INMUNET • HOM+ (SOLO VARONES)	1 Cap. antes del desayuno y cena 1 Cap. una hora antes del desayuno y cena 2 Cap. después de desayuno
CRECIMIENTO INFANTIL	• SPIRULINA • FNC	1 Cap. media hora antes de cada comida. 1 Caps. una hora antes del desayuno
CIRROSIS HEPÁTICA	• NUCELHE • SPIRULINA • INMUNET	1 Cap. media hora antes de cada comida. 1 Cap. en cada comida. 1 Cap. antes del desayuno y cena
COLESTEROL ELEVADO	• NUCELHE • INMUNET	1 Cap. media hora antes de cada comida. 1 Caps. antes del desayuno.
COLELITIASIS	• NUCELHE • INMUNET	1 Cap. media hora antes de cada comida 1 Cap. una hora antes del desayuno
DEFENSAS BAJAS	• INMUNET • FNC	1 Cap. antes de desayuno y cena 1 Cap. al levantarse y acostarse.
DIABETES	• RGS • INMUNET • FNC	1 Cap. media hora antes de cada comida. 1 Cap. una hora antes del desayuno y cena 1 Cap. al acostarse y levantarse .



PROBLEMA DE SALUD	PRODUCTO SUGERIDO Principal/complementario	MODO DE CONSUMO
DISFUNCIÓN ERÉCTIL Impotencia	• HOM+ • FNC • INMUNET	2 Cap. después del desayuno. 1 Cap. antes del desayuno y cena 1 Cap. una hora antes de desayuno y cena
DOLOR Y FIEBRE	• DOLIV • INMUNET	2 Caps. después de cada comida x 10 días 1 Cap. una hora antes del desayuno y cena
ESTREÑIMIENTO CRÓNICO	• BPRO • OXY-COLON • S3 • VITAL FSN	2 Caps. después del desayuno. 1 Cap. después de cena. 2 Caps. una hora antes de dormir 1 Cap. después del desayuno
ESTRÉS	• S3 • VITAL FSN • INMUNET	2 Caps. una hora antes de dormir. 1 Cap. después del desayuno 1 Cap. una hora antes del desayuno y cena
ESCLEROSIS/ ESCLERODERMIA	• FACTOR P53 • YOUNG • INMUNET • DOLIV	2 Cap. media hora antes de cada comida. 1 Cap. media hora antes de desayuno y cena. 1 Cap. una hora antes del desayuno y cena. 2 ó 3 capsulas cuando hay dolor
FIBROSIS PULMONAR	• INMUNET • CORDYCEPS • YOUNG	2 Cap. una hora antes del desayuno y cena 1 Cap. media hora antes de cada comida. 1 Cap. media hora antes de desayuno y cena.
GASTRITIS - H. PYLORI	• G3 • NUCELHE • HI-D	2 ó 3 Caps. una hora después de cada comida. 1 Cap. media hora antes del desayuno y cena. 2 Sachet al día



PROBLEMA DE SALUD	PRODUCTO SUGERIDO Principal/complementario	MODO DE CONSUMO
HEMORROIDES	• REVE • FNC • INMUNET • BPRO	2 Cap. antes de cada comida 1 Cap. con el desayuno y cena 1 Cap. una hora antes del desayuno y cena 2 Caps. después de desayuno
HEPATITIS	• NUCELHE • FNC • INMUNET	1 Cap. media hora antes de cada comida 1 Cap. al acostarse y levantarse. 1 Cap. una hora antes del desayuno y cena
HÍGADO GRASO	• NUCELHE • INMUNET	1 Cap. media hora antes del desayuno y cena. 2 Caps. una hora antes del desayuno.
HIPO/HIPER TIROIDISMO	• FACTOR P53 • YOUNG • INMUNET	1 Caps. media hora antes de cada comida. 1 Caps. media hora antes de desayuno y cena.. 1 Cap. una hora antes de desayuno y cena
HONGOS	• SPHO • INMUNET	2 Caps. una hora después de la comida 1 Caps. una hora antes del desayuno y cena.
INSOMNIO	• S3 • INMUNET	2 Caps. una hora antes de dormir. 1 cap. antes de desayuno y cena
INFECCIÓN DE LAS VIAS URINARIAS	• NEF • INMUNET • DOLIV	1 Cap. una hora antes de desayuno y cena 1 Caps. media hora antes de cada comida. 2 Cap. después de cada comida x 10 días



PROBLEMA DE SALUD	PRODUCTO SUGERIDO Principal/complementario	MODO DE CONSUMO
LUMBALGIA	• DOLIV • REVIT C • INMUNET • YOUNG	2 Cap. después de cada comida x 15 días Una cucharada dosificadora en ayunas 1 Caps. una hora antes del desayuno. 1 Cap. media hora antes de desayuno y cena.
LEUCEMIA	• FACTOR P53 • INMUNET • SPIRULINA • YOUNG	2 Cap. media hora antes de cada comida. 1 Cap. una hora antes del desayuno y cena 1 Cap. en cada comida. 1 Cap. media hora antes de desayuno y cena.
LUPUS	• FACTOR P53 • INMUNET • DOLIV • YOUNG	3 Cap. media hora antes de cada comida. 1 Cap. una hora antes del desayuno y cena 2 ó 3 Caps. cuando hay dolor 1 Cap. media hora antes de desayuno y cena
LIMPIEZA DE COLON	• OXY-COLON • BPRO • HI D	2 Caps. una hora después de cada comida. 2 caps. después del desayuno 2 Sachet x día
MALA CIRCULACIÓN	• FNC • NUCELHE • INMUNET	1 Cap. al levantarse y acostarse 1 Cap. media hora antes del desayuno y cena. 1 Cap. una hora antes del desayuno y cena
MENOPAUSIA	• EHFEM • FNC	1 Cap. una hora antes del desayuno y cena. 1 Cap. al levantarse y acostarse.
MIGRAÑA	• DOLIV • VITAL FSN • ENERGY	2 Caps. después de desayuno. 1 Cap. después de desayuno 1 Caps. después de desayuno.



PROBLEMA DE SALUD	PRODUCTO SUGERIDO Principal/complementario	MODO DE CONSUMO
MIOMAS EN EL ÚTERO	• EHFEM • FNC • INMUNET	1 Cap. una hora antes del desayuno y cena. 1 Cap. al levantarse y acostarse. 1 Cap. una hora antes de desayuno y cena
OSTEOPOROSIS	• BIOCAL • REVIT C • INMUNET	2 Caps. en cada comida. 10 una cucharada dosificadora en ayunas. 1 Caps. una hora antes del desayuno y cena
OVARIOS POLIQUÍSTICOS	• EHFEM • DOLIV • INMUNET	1 Cap. una hora antes del desayuno y cena. 2 Caps. cuando hay dolor. 2 Cap. una hora antes de desayuno y cena
PIEL FLACIDA Y ENVEJECIDA	• REVIT C • INMUNET • YOUNG	10 Una cucharada dosificadora en ayunas. 2 Capsula antes de desayuno 1 Cap. media hora antes del desayuno y cena.
PARKINSON	• INMUNET • VITAL FSN • YOUNG	2 Caps. una hora antes del desayuno y cena. 1 Cap. después de desayuno. 1 Cap. media hora antes del desayuno y cena.
PRE DERRAME	• VITAL FSN • INMUNET • FNC	2 Cap. después del desayuno y cena 1 Cap. una hora antes del desayuno y cena 1 Cap. al levantarse y al acostarse.
PRESIÓN ALTA	• FNC • INMUNET	1 Cap. media hora antes del desayuno y cena 1 Cap. una hora antes del desayuno y cena



PROBLEMA DE SALUD	PRODUCTO SUGERIDO Principal/complementario	MODO DE CONSUMO
PRÓSTATA CRECIDA HPB	• HOM+ • FNC • INMUNET	2 Caps. después del desayuno. 1 Cap. al levantarse y al acostarse. 1 Cap. antes de desayuno y cena
RESFRIOS /GRIPE	• DOLIV • INMUNET	2 Caps. después de cada comida x 7 días. 1 Cap. una hora antes del desayuno y cena
SIND. DE COLON IRRITABLE	• S3 • INMUNET • BPRO	2 o 3 Caps. una hora antes de dormir. 1 Caps. una hora antes del desayuno y cena 2 Caps. una hora antes del desayuno.
PSORIASIS	• FACTOR P53 • INMUNET • YOUNG	2 Caps. media hora antes de cada comida. 1 Cap. una hora antes del desayuno y cena 1 Cap. media hora antes del desayuno y cena
TOS CRÓNICA	• INMUNET • CORDYCEPS • YOUNG	2 Caps. una hora antes del desayuno. 1 Cap. media hora antes de cada comida. 1 cap. Media hora antes de desayuno y cena
TRIGLICÉRIDOS ELEVADOS	• NUCELHE • FNC • INMUNET	1 Cap. media hora antes del desayuno y cena. 1 Cap. al levantarse y al acostarse. 1 Caps. una hora antes del desayuno y cena
TUMORES BENIGNOS	• INMUNET • FACTOR P53 • YOUNG	1 Cap. una hora antes del desayuno y cena 1 Cap. media hora antes de cada comida. 1 Cap. media hora antes de desayuno y cena.



PROBLEMA DE SALUD	PRODUCTO SUGERIDO Principal/complementario	MODO DE CONSUMO
ÚLCERA GÁSTRICA	• G3 • NUCELHE • FNC	1 ó 2 Cap. una hora después de cada comida. 1 Cap. media hora antes del desayuno y cena. 1 Cap. al levantarse y al acostarse.
VARICES	• REVE • FNC • INMUNET • YOUNG	2 Cap. antes de cada comida. 1 Caps. una hora antes del desayuno y cena 1 Cap. en cada comida. 1 Cap. media hora antes del desayuno y cena.
VEJEZ PREMATURA.	• YOUNG • SPIRULINA	2 Cap. media hora antes del desayuno. 1 Cap. media hora antes del desayuno y cena.
VITILIGO	• FACTOR P53 • INMUNET • YOUNG	2 Cap. media hora antes de cada comida. 1 cap. antes del desayuno y cena 1 Cap. al levantarse y acostarse.
VIRUS DEL PAPILOMA H. (VPH)	• FACTOR P53 • YOUNG • INMUNET	2 Cap. media hora antes de cada comida. 1 Cap. Media hora antes de desayuno y cena 2 Caps. una hora antes del desayuno.
VISIÓN BORROSA Y DEGENERACIÓN MACULAR	• V+ • YOUNG	1 ó 2 Caps. media hora antes del desayuno. 1 Caps. media hora antes del desayuno y cena.

Para todo tratamiento de enfermedades metabólicas, autoinmunes, degenerativas, neurodegenerativas, congénitas y por mutación celular, RECOMENDAR “YOUNG”

RECOMENDACIONES BÁSICAS ALIMENTARIAS DURANTE EL CONSUMO DE PRODUCTOS LIVINOE



QUE NO CONSUMIR	QUE Y CUANTO CONSUMIR	
Carnes rojas	Verduras y hortalizas	Mínimo 3 colores, porción abundante
Carnes tóxicas (Cerdo y mariscos)	Frutas	De una clase por vez
Azúcar, postres y bebidas gaseosas	Cereales y germinados	De toda variedad, porción moderada
Enlatados y conservas	Hongos naturales	De toda variedad porciones pequeñas
Leche y huevos de granjas	Frutos secos	Porciones pequeñas
Harinas refinadas (Pan, fideos, etc.)	Grasas naturales	Porciones pequeñas
Condimentos y productos irritantes	Sal Rosada/Maras	Al gusto
Sal yodada y aceites hidrogenados	Agua	2 Litros x día
Todo producto envasado que contenga conservantes, saborizantes y colorantes sintéticos (alimentos ultra procesados)	Stevia para endulzar	Al gusto
	Carnes blancas de crianza libre y huevos de corral	Porciones pequeñas