# GUIA DE RECOMENDACIÓN

Tratamientos alternativos



# PROBLEMAS DE SALUD

ÁCIDO ÚRICO/ GOTA
ACNÉ JUVENIL
AGOTAMIENTO
ALZHEIMER
AMNESIA
ANEMIA
ANSIEDAD - DEPRESIÓN
ART. REUMATOIDEA
ARTROSIS
ASMA BRONQUIAL
ALTERACIÓN NERVIOSA
AGOTAMIENTO FÍSICO
CÁLCULOS RENALES
CÁNCER
CIRROSIS HEPÁTICA
COLESTEROL ELEVADO
COLELITIASIS
CRECIMIENTO INFANTIL
CAÍDA DEL CABELLO
DESEQUILIBRIO NERVIOSO
DEFENSAS BAJAS
DIABETES
DISFUNCIÓN ERECTIL
DOLOR y FIEBRE
ESTREÑIMIENTO
ESTRÉS
ESCLERODERMIA
FIBROSIS PULMONAR
GASTRITIS - BACTERIA HP
HEMORROIDES
HEPATITIS
HÍGADO GRASO
HIPERTIROIDISMO
INSOMNIO
INFLAMACIONES
INFECCIÓN VIAS URINARIAS
LUMBALGIA
LEUCEMIA
LUPUS
LIMPIEZA DE COLON
MALA CIRCULACIÓN
MENOPAUSIA
MIGRAÑA
MIOMAS UTERINOS
OSTEOPOROSIS
OV. POLIQUÍSTICOS
PIEL FLÁCIDA
PARKINSON
PRE DERRAME
PRESIÓN ALTA
PROSTATITIS
PSORIASIS
RESFRIOS /GRIPE
SIND. DE COLON IRRITABLE
TRIGLICÉRIDOS ELEVADOS
TOS CRÓNICA
TUMORES BENIGNOS
ÚLCERA GÁSTRICA
VARICES
VEJEZ PREMATURA
VITILIGO
VIRUS DEL PAPILOMA H. (VPH)
VISIÓN BORROSA/CATARATA

Livi Noe
*Mejora tu vida...!*

# IMPORTANTE

**La presente guía de recomendaciones de consumo de productos Livinoe está elaborado bajo criterios profesionales y basado en los resultados obtenidos.**

**Los productos Livinoe son formulados con extractos naturales estandarizados, por lo que tienen efecto regenerativo y nutricional, no presentan ninguna contraindicación ni efecto secundario.**

**Los productos Livinoe también cumplen la función preventiva y complementaria a la alimentación diaria; para este uso se recomienda consumir la mitad de la cantidad recomendada.**

LIVINOE

NUEVA GUIA DE RECOMENDACIÓN

LiviNoe

| PROBLEMA DE SALUD | PRODUCTO SUGERIDO<br>Principal/complementario | MODO DE CONSUMO |
|---|---|---|
| ÁCIDO ÚRICO/ GOTA | • INMUNET<br>• NEF<br>• FNC | 1 Caps. una hora antes del desayuno y cena<br>1 Cap. media hora antes del desayuno y cena.<br>1 Cap. al acostarse y levantarse |
| ACNÉ JUVENIL | • YOUNG<br>• INMUNET/ EHFEM<br>• FNC | 1 Caps. media hora antes del desayuno.<br>1 Caps. una hora antes del desayuno.<br>1 Cap. al acostarse y levantarse |
| AGOTAMIENTO FíSICO | • ENERGY NL<br>• SPIRULINA | 1 ó 2 Caps. después del desayuno.<br>1 Cap. en cada comida |
| ALZHEIMER | • INMUNET<br>• YOUNG<br>• VITAL FSN | 1 Caps. una hora antes del desayuno y cena.<br>1 Cap. media hora antes del desayuno y cena.<br>1 Cap. después del desayuno. |
| AMNESIA | • INMUNET<br>• VITAL FSN<br>• YOUNG | 2 Cap. una hora antes del desayuno.<br>1 Cap. después del desayuno.<br>1 Cap. media hora antes de desayuno y cena. |
| ANEMIA | • SPIRULINA<br>• FNC<br>• INMUNET | 3 Cap. en cada comida.<br>1 Cap. al levantarse y al acostarse.<br>1 Caps. una hora antes del desayuno y cena |
| ANSIEDAD - DEPRESIÓN | • VITAL FSN<br>• INMUNET<br>• S3 | 1 ó 2 Cap. después de desayuno<br>1 Cap. una hora antes del desayuno y cena.<br>2 Caps. una hora antes de dormir. |

NUEVA GUIA DE RECOMENDACIÓN

LiviNoe

| PROBLEMA DE SALUD | PRODUCTO SUGERIDO<br>Principal/complementario | MODO DE CONSUMO |
|---|---|---|
| ART. REUMATOIDEA | • FACTOR P53<br>• YOUNG<br>• INMUNET<br>• REVIT HT2<br>• DOLIV | 2 Cap. media hora antes de cada comida.<br>1 Cap. media hora antes de desayuno y cena<br>1 Cap. una hora antes del desayuno y cena<br>1 Cap. después del desayuno y cena<br>2 Cap. cuando hay dolor |
| ARTROSIS | • REVIT HT2<br>• BIOCAL<br>• DOLIV<br>• INMUNET | 2 Cap. después del desayuno y cena.<br>1 Cap. en cada comida.<br>2 Caps. cuando hay dolor<br>1 Cap. una hora antes del desayuno y cena |
| ASMA BRONQUIAL | • FACTOR P53<br>• INMUNET<br>• SPIRULINA | 1 Cap. media hora antes de cada comida.<br>1 Cap. una hora antes del desayuno y cena<br>1 Cap. en cada comida |
| ALTERACIÓN NERVIOSA | • VITAL FSN<br>• INMUNET | 2 Cap. después del desayuno<br>1 Cap. una hora antes del desayuno y cena |
| ALERGIAS | • FACTOR P53<br>• SPIRULINA<br>• INMUNET | 1 Cap. antes del desayuno y cena.<br>1 Cap. en cada comida.<br>1 Cap. antes del desayuno y cena |
| CÁLCULOS RENALES/<br>ARENILLA | • NEF<br>• FNC<br>• INMUNET | 1 Cap. media hora antes de cada comida.<br>1 Cap. antes del desayuno<br>1 Cap. una hora antes del desayuno y cena |
| CÁNCER | • FACTOR P53<br>• INMUNET<br>• YOUNG<br>• SPIRULINA<br>• DOLIV | 3 Cap. media hora antes de cada comida.<br>1 Cap. una hora antes del desayuno y cena<br>1 Cap. media hora antes de desayuno y cena.<br>1 Cap. en cada comida.<br>2 ó 3 Caps. Cuando hay dolor |

NUEVA GUIA DE RECOMENDACIÓN

LiviNoe

| PROBLEMA DE SALUD | PRODUCTO SUGERIDO<br>Principal/complementario | MODO DE CONSUMO |
|---|---|---|
| CAíDA DEL CABELLO | • YOUNG<br>• INMUNET<br>• HOM+ (SOLO VARONES) | 1 Cap. antes del desayuno y cena<br>1 Cap. una hora antes del desayuno y cena<br>2 Cap. después de desayuno |
| CRECIMIENTO INFANTIL | • SPIRULINA<br>• FNC | 1 Cap. media hora antes de cada comida.<br>1 Caps. una hora antes del desayuno |
| CIRROSIS HEPÁTICA | • NUCELHE<br>• SPIRULINA<br>• INMUNET | 1 Cap. media hora antes de cada comida.<br>1 Cap. en cada comida.<br>1 Cap. antes del desayuno y cena |
| COLESTEROL ELEVADO | • NUCELHE<br>• INMUNET | 1 Cap. media hora antes de cada comida.<br>1 Caps. antes del desayuno. |
| COLELITIASIS | • NUCELHE<br>• INMUNET | 1 Cap. media hora antes de cada comida<br>1 Cap. una hora antes del desayuno |
| DEFENSAS BAJAS | • INMUNET<br>• FNC | 1 Cap. antes de desayuno y cena<br>1 Cap. al levantarse y acostarse. |
| DIABETES | • RGS<br>• INMUNET<br>• FNC | 1 Cap. media hora antes de cada comida.<br>1 Cap. una hora antes del desayuno y cena<br>1 Cap. al acostarse y levantarse<br>. |

NUEVA GUIA DE RECOMENDACIÓN

Livi Noe

| PROBLEMA DE SALUD | PRODUCTO SUGERIDO<br>Principal/complementario | MODO DE CONSUMO |
|---|---|---|
| DISFUNCIÓN ERÉCTIL<br>Impotencia | • HOM+<br>• FNC<br>• INMUNET | 2 Cap. después del desayuno.<br>1 Cap. antes del desayuno y cena<br>1 Cap. una hora antes de desayuno y cena |
| DOLOR Y FIEBRE | • DOLIV<br>• INMUNET | 2 Caps. después de cada comida x 10 días<br>1 Cap. una hora antes del desayuno y cena |
| ESTREÑIMIENTO CRÓNICO | • BPRO<br>• OXY-COLON<br>• S3<br>• VITAL FSN | 2 Caps. después del desayuno.<br>1 Cap. después de cena.<br>2 Caps. una hora antes de dormir<br>1 Cap. después del desayuno |
| ESTRÉS | • S3<br>• VITAL FSN<br>• INMUNET | 2 Caps. una hora antes de dormir.<br>1 Cap. después del desayuno<br>1 Cap. una hora antes del desayuno y cena |
| ESCLEROSIS/ ESCLERODERMIA | • FACTOR P53<br>• YOUNG<br>• INMUNET<br>• DOLIV | 2 Cap. media hora antes de cada comida.<br>1 Cap. media hora antes de desayuno y cena.<br>1 Cap. una hora antes del desayuno y cena.<br>2 ó 3 capsulas cuando hay dolor |
| FIBROSIS PULMONAR | • INMUNET<br>• CORDYCEPS<br>• YOUNG | 2 Cap. una hora antes del desayuno y cena<br>1 Cap. media hora antes de cada comida.<br>1 Cap. media hora antes de desayuno y cena. |
| GASTRITIS - H. PYLORI | • G3<br>• NUCELHE<br>• HI-D | 2 ó 3 Caps. una hora después de cada comida.<br>1 Cap. media hora antes del desayuno y cena.<br>2 Sachet al día |

NUEVA GUIA DE RECOMENDACIÓN

LiviNoe

| PROBLEMA DE SALUD | PRODUCTO SUGERIDO<br>Principal/complementario | MODO DE CONSUMO |
|---|---|---|
| HEMORROIDES | • REVE<br>• FNC<br>• INMUNET<br>• BPRO | 2 Cap. antes de cada comida<br>1 Cap. con el desayuno y cena<br>1 Cap. una hora antes del desayuno y cena<br>2 Caps. después de desayuno |
| HEPATITIS | • NUCELHE<br>• FNC<br>• INMUNET | 1 Cap. media hora antes de cada comida<br>1 Cap. al acostarse y levantarse.<br>1 Cap. una hora antes del desayuno y cena |
| HÍGADO GRASO | • NUCELHE<br>• INMUNET | 1 Cap. media hora antes del desayuno y cena.<br>2 Caps. una hora antes del desayuno. |
| HIPO/HIPER TIROIDISMO | • FACTOR P53<br>• YOUNG<br>• INMUNET | 1 Caps. media hora antes de cada comida.<br>1 Caps. media hora antes de desayuno y cena..<br>1 Cap. una hora antes de desayuno y cena |
| HONGOS | • SPHO<br>• INMUNET | 2 Caps. una hora después de la comida<br>1 Caps. una hora antes del desayuno y cena. |
| INSOMNIO | • S3<br>• INMUNET | 2 Caps. una hora antes de dormir.<br>1 cap. antes de desayuno y cena |
| INFECCIÓN DE LAS VIAS URINARIAS | • NEF<br>• INMUNET<br>• DOLIV | 1 Cap. una hora antes de desayuno y cena<br>1 Caps. media hora antes de cada comida.<br>2 Cap. después de cada comida x 10 días |

NUEVA GUIA DE RECOMENDACIÓN

Livi Noe

| PROBLEMA DE SALUD | PRODUCTO SUGERIDO<br>Principal/complementario | MODO DE CONSUMO |
|---|---|---|
| LUMBALGIA | • DOLIV<br>• REVIT C<br>• INMUNET<br>• YOUNG | 2 Cap. después de cada comida x 15 días<br>Una cucharada dosificadora en ayunas<br>1 Caps. una hora antes del desayuno.<br>1 Cap. media hora antes de desayuno y cena. |
| LEUCEMIA | • FACTOR P53<br>• INMUNET<br>• SPIRULINA<br>• YOUNG | 2 Cap. media hora antes de cada comida.<br>1 Cap. una hora antes del desayuno y cena<br>1 Cap. en cada comida.<br>1 Cap. media hora antes de desayuno y cena. |
| LUPUS | • FACTOR P53<br>• INMUNET<br>• DOLIV<br>• YOUNG | 3 Cap. media hora antes de cada comida.<br>1 Cap. una hora antes del desayuno y cena<br>2 ó 3 Caps. cuando hay dolor<br>1 Cap. media hora antes de desayuno y cena |
| LIMPIEZA DE COLON | • OXY-COLON<br>• BPRO<br>• HI D | 2 Caps. una hora después de cada comida.<br>2 caps. después del desayuno<br>2 Sachet x día |
| MALA CIRCULACIÓN | • FNC<br>• NUCELHE<br>• INMUNET | 1 Cap. al levantarse y acostarse<br>1 Cap. media hora antes del desayuno y cena.<br>1 Cap. una hora antes del desayuno y cena |
| MENOPAUSIA | • EHFEM<br>• FNC | 1 Cap. una hora antes del desayuno y cena.<br>1 Cap. al levantarse y acostarse. |
| MIGRAÑA | • DOLIV<br>• VITAL FSN<br>• ENERGY | 2 Caps. después de desayuno.<br>1 Cap. después de desayuno<br>1 Caps. después de desayuno. |

NUEVA GUIA DE RECOMENDACIÓN

Livi Noe

| PROBLEMA DE SALUD | PRODUCTO SUGERIDO<br>Principal/complementario | MODO DE CONSUMO |
|---|---|---|
| MIOMAS EN EL ÚTERO | • **EHFEM**<br>• FNC<br>• INMUNET | 1 Cap. una hora antes del desayuno y cena.<br>1 Cap. al levantarse y acostarse.<br>1 Cap. una hora antes de desayuno y cena |
| OSTEOPOROSIS | • **BIOCAL**<br>• REVIT C<br>• INMUNET | 2 Caps. en cada comida.<br>10 una cucharada dosificadora en ayunas.<br>1 Caps. una hora antes del desayuno y cena |
| OVARIOS POLIQUÍSTICOS | • **EHFEM**<br>• DOLIV<br>• INMUNET | 1 Cap. una hora antes del desayuno y cena.<br>2 Caps. cuando hay dolor.<br>2 Cap. una hora antes de desayuno y cena |
| PIEL FLACIDA Y ENVEJECIDA | • **REVIT C**<br>• INMUNET<br>• YOUNG | 10 Una cucharada dosificadora en ayunas.<br>2 Capsula antes de desayuno<br>1 Cap. media hora antes del desayuno y cena. |
| PARKINSON | • **INMUNET**<br>• VITAL FSN<br>• YOUNG | 2 Caps. una hora antes del desayuno y cena.<br>1 Cap. después de desayuno.<br>1 Cap. media hora antes del desayuno y cena. |
| PRE DERRAME | • **VITAL FSN**<br>• INMUNET<br>• FNC | 2 Cap. después del desayuno y cena<br>1 Cap. una hora antes del desayuno y cena<br>1 Cap. al levantarse y al acostarse. |
| PRESIÓN ALTA | • **FNC**<br>• INMUNET | 1 Cap. media hora antes del desayuno y cena<br>1 Cap. una hora antes del desayuno y cena |

NUEVA GUIA DE RECOMENDACIÓN

LiviNoe

| PROBLEMA DE SALUD | PRODUCTO SUGERIDO<br>Principal/complementario | MODO DE CONSUMO |
|---|---|---|
| PRÓSTATA CRECIDA<br>HPB | • HOM+<br>• FNC<br>• INMUNET | 2 Caps. después del desayuno.<br>1 Cap. al levantarse y al acostarse.<br>1 Cap. antes de desayuno y cena |
| RESFRIOS /GRIPE | • DOLIV<br>• INMUNET | 2 Caps. después de cada comida x 7 días.<br>1 Cap. una hora antes del desayuno y cena |
| SIND. DE COLON IRRITABLE | • S3<br>• INMUNET<br>• BPRO | 2 o 3 Caps. una hora antes de dormir.<br>1 Caps. una hora antes del desayuno y cena<br>2 Caps. una hora antes del desayuno. |
| PSORIASIS | • FACTOR P53<br>• INMUNET<br>• YOUNG | 2 Caps. media hora antes de cada comida.<br>1 Cap. una hora antes del desayuno y cena<br>1 Cap. media hora antes del desayuno y cena |
| TOS CRÓNICA | • INMUNET<br>• CORDYCEPS<br>• YOUNG | 2 Caps. una hora antes del desayuno.<br>1 Cap. media hora antes de cada comida.<br>1 cap. Media hora antes de desayuno y cena |
| TRIGLICÉRIDOS ELEVADOS | • NUCELHE<br>• FNC<br>• INMUNET | 1 Cap. media hora antes del desayuno y cena.<br>1 Cap. al levantarse y al acostarse.<br>1 Caps. una hora antes del desayuno y cena |
| TUMORES BENIGNOS | • INMUNET<br>• FACTOR P53<br>• YOUNG | 1 Cap. una hora antes del desayuno y cena<br>1 Cap. media hora antes de cada comida.<br>1 Cap. media hora antes de desayuno y cena. |

NUEVA GUIA DE RECOMENDACIÓN

LiviNoe

| PROBLEMA DE SALUD | PRODUCTO SUGERIDO<br>Principal/complementario | MODO DE CONSUMO |
|---|---|---|
| ÚLCERA GÁSTRICA | • G3<br>• NUCELHE<br>• FNC | 1 ó 2 Cap. una hora después de cada comida.<br>1 Cap. media hora antes del desayuno y cena.<br>1 Cap. al levantarse y al acostarse. |
| VARICES | • REVE<br>• FNC<br>• INMUNET<br>• YOUNG | 1 Cap. antes de cada comida.<br>1 Caps. una hora antes del desayuno y cena<br>1 Cap. en cada comida.<br>1 Cap. media hora antes del desayuno y cena. |
| VEJEZ PREMATURA. | • YOUNG<br>• SPIRULINA | 2 Cap. media hora antes del desayuno.<br>1 Cap. media hora antes del desayuno y cena. |
| VITILIGO | • FACTOR P53<br>• INMUNET<br>• YOUNG | 2 Cap. media hora antes de cada comida.<br>1 cap. antes del desayuno y cena<br>1 Cap. al levantarse y acostarse. |
| VIRUS DEL PAPILOMA H. (VPH) | • FACTOR P53<br>• YOUNG<br>• INMUNET | 2 Cap. media hora antes de cada comida.<br>1 Cap. Media hora antes de desayuno y cena<br>2 Caps. una hora antes del desayuno. |
| VISIÓN BORROSA Y DEGENERACIÓN MACULAR | • V+<br>• YOUNG | 1 ó 2 Caps. media hora antes del desayuno.<br>1 Caps. media hora antes del desayuno y cena. |

Para todo tratamiento de enfermedades metabólicas, autoinmunes, degenerativas, neurodegenerativas, congénitas y por mutación celular, RECOMENDAR “YOUNG”

# RECOMENDACIONES BÁSICAS ALIMENTARIAS DURANTE EL CONSUMO DE PRODUCTOS LIVINOE



| QUE NO CONSUMIR | QUE Y CUANTO CONSUMIR | |
|---|---|---|
| Carnes rojas | Verduras y hortalizas | Mínimo 3 colores, porción abundante |
| Carnes tóxicas (Cerdo y mariscos) | Frutas | De una clase por vez |
| Azúcar, postres y bebidas gaseosas | Cereales y germinados | De toda variedad, porción moderada |
| Enlatados y conservas | Hongos naturales | De toda variedad porciones pequeñas |
| Leche y huevos de granjas | Frutos secos | Porciones pequeñas |
| Harinas refinadas (Pan, fideos, etc.) | Grasas naturales | Porciones pequeñas |
| Condimentos y productos irritantes | Sal Rosada/Maras | Al gusto |
| Sal yodada y aceites hidrogenados | Agua | 2 Litros x día |
| Todo producto envasado que contenga conservantes, saborizantes y colorantes sintéticos (alimentos ultra procesados) | Stevia para endulzar | Al gusto |
| | Carnes blancas de crianza libre y huevos de corral | Porciones pequeñas |